

Objectif

Le présent document porte sur la disponibilité et le calendrier d'inoculation des nouveaux vaccins bivalents de Moderna et de Pfizer contre la COVID-19, les critères révisés concernant les doses de rappel pour les enfants de 5 à 11 ans et les types de vaccins disponibles. Santé Canada a annoncé l'introduction des vaccins bivalents de Moderna et de Pfizer contre la COVID-19 le 1^{er} septembre 2022 et le 7 octobre 2022, respectivement. Les renseignements ont été recueillis du **9 septembre 2022 au 25 octobre 2022**

Auditoire

- Acteurs de la santé publique, décideurs politiques (tous les niveaux de gouvernement)

Méthodologie

- La plupart des renseignements sont collectés à partir de sources accessibles au public, en donnant la priorité à des ressources telles que des sites Web gouvernementaux, mais elles peuvent également inclure du contenu médiatique provenant d'articles de presse. Comme les renseignements changent rapidement, le contenu est validé et complété par des experts en santé publique, lorsqu'ils sont disponibles et que le temps le permet.

Province	Doses primaires	Première dose de rappel/troisième dose	Dose de rappel supplémentaire (incluant bivalent)
C.-B.	<p>Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus sont admissibles pour recevoir un vaccin primaire contre la COVID-19.</p> <p>Vaccins disponibles :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pour les enfants de 6 mois à 4 ans : Spikevax de Moderna Pour les 5 à 11 ans : vaccin de Pfizer Pour les 12 à 17 ans : vaccin de Pfizer ou de Moderna Vaccin de Janssen Vaccin de Novavax <ul style="list-style-type: none"> La série de primovaccins est proposée à environ 56 jours d'intervalle. Pour les personnes immunodéprimées, une troisième 	<p>Enfants âgés de 6 mois et 5 ans Non admissible</p> <p>Enfants âgés de 5 à 11 ans Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 mois après avoir terminé leur série initiale Le vaccin de Pfizer est approuvé. <p>Personnes âgées de 12 à 17 ans Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaccins à ARNm (Moderna, Pfizer) proposés en dose de rappel. Les femmes enceintes de 12 ans et plus peuvent recevoir une dose de rappel 8 semaines après leur série de vaccinations initiale. <p>Personnes âgées de 18 ans et plus Admissible</p>	<p>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans Non admissible</p> <p>Enfants âgés de 5 à 11 ans Non admissible</p> <p>Personnes âgées de 12 à 17 ans Admissible</p> <p>Personnes âgées de 18 ans et plus Admissible</p> <p>Vaccin bivalent :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin bivalent de Pfizer est approuvé chez les personnes âgées de 12 ans et plus présentant un risque plus élevé de développer une forme grave de la maladie.

Province	Doses primaires	Première dose de rappel/troisième dose	Dose de rappel supplémentaire (incluant bivalent)
	ou quatrième dose est incluse dans la série primaire et la troisième dose est administrée 4 semaines après la deuxième dose.	<ul style="list-style-type: none"> Les vaccins de Moderna, de Pfizer, de Novavax et de Janssen sont disponibles. 	<ul style="list-style-type: none"> Les personnes de 18 ans et plus se voient offrir le vaccin bivalent de Moderna.
Alb.	<p>Tous les Albertains âgés de 6 mois et plus peuvent prendre rendez-vous pour leur première dose.</p> <p><u>Vaccins disponibles :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Vaccin Moderna : pour les enfants de 6 mois à 4 ans, 2 doses, à 1 mois d'intervalle. Vaccin de Pfizer : 5 ans et plus, 2 doses, à 21 jours d'intervalle. Janssen (Johnson & Johnson) : Pour les personnes de 18 ans et plus, en dose unique. Novavax : pour les personnes de 18 ans et plus, 2 doses, à 21 jours d'intervalle. <ul style="list-style-type: none"> AstraZeneca (COVISHIELD) n'est plus disponible. Les vaccins de Novavax et de Janssen sont uniquement disponibles par le biais de Health Link en appelant le 811. 	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 mois après leur série initiale Le vaccin de Pfizer est approuvé pour une dose de rappel. <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Les vaccins de Moderna et de Pfizer sont recommandés 5 mois après leur série initiale <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Pfizer, Moderna, Janssen et Novavax. Janssen est administré en une seule dose, 2 mois après la première dose. 	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaccins à ARNm et de Novavax. 5 mois après leur première dose de rappel. Attendez au moins 3 mois après une infection à la COVID-19 avant de recevoir une dose de rappel. <p><u>Vaccin bivalent :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin bivalent de Pfizer est disponible pour les personnes de 12 ans et plus. Le vaccin bivalent de Moderna est recommandé pour les personnes de 18 ans et plus, à un intervalle de 5 mois après la deuxième dose.
Sask.	Tous les résidents de la Saskatchewan âgés de 6 mois et plus peuvent recevoir le vaccin contre la COVID-19.	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p>	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p>

Province	Doses primaires	Première dose de rappel/troisième dose	Dose de rappel supplémentaire (incluant bivalent)
	<p><u>Vaccins disponibles :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Vaccin de Moderna : pour les enfants de 6 mois à 5 ans, à 8 semaines d'intervalle. Les enfants modérément à gravement immunodéprimés doivent recevoir 3 doses en série primaire à 4 à 8 semaines d'intervalle. Pfizer : pour les enfants de 5 à 11 ans, à 8 semaines d'intervalle. Janssen : Administré en dose unique Novavax 	<p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Les vaccins à ARNm sont recommandés. 4 mois après leur série initiale Les personnes infectées par la COVID-19 doivent attendre 8 semaines entre l'infection et toute dose du vaccin contre la COVID-19. <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin bivalent de Pfizer est approuvé pour ce groupe d'âge. <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin bivalent de Moderna est approuvé. 	<p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> Admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 mois après leur première dose de rappel <p><u>Vaccin bivalent :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin bivalent Comirnaty de Pfizer pour les personnes de 12 ans et plus au moins 4 mois après la série primaire Vaccin bivalent de Moderna – personnes de 12 ans et plus, modérément à gravement immunodéprimées
Man.	<p>Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus sont admissibles pour recevoir un vaccin primaire contre la COVID-19.</p> <p><u>Vaccins disponibles :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Moderna : pour les enfants de 6 mois à 5 ans, à 8 semaines d'intervalle. Pfizer : pour les enfants de 5 à 11 ans, à 8 semaines d'intervalle entre 2 doses. Les vaccins à ARNm (Pfizer et Moderna) sont approuvés pour les personnes âgées de 12 ans et plus, 	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin de Pfizer est approuvé pour être utilisé avec Moderna. 6 mois après avoir terminé leur série initiale. <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Les vaccins de Pfizer et de Moderna sont approuvés. 6 mois après leur série initiale. 	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> Admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u> Admissible</p> <p><u>Vaccin bivalent :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Vaccin bivalent de Pfizer pour les personnes de 12 ans et plus.

Province	Doses primaires	Première dose de rappel/troisième dose	Dose de rappel supplémentaire (incluant bivalent)
	<p>avec un intervalle de 8 semaines entre les doses.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Novavax 5. Janssen 	<p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les vaccins à ARNm sont disponibles pour une dose de rappel à 6 mois d'intervalle après leur série primaire. • Novavax est approuvé pour une dose de rappel uniquement chez les enfants de plus de 18 ans. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vaccin bivalent de Moderna pour les personnes de 18 ans et plus. • Les vaccins bivalents de Pfizer ou de Moderna sont approuvés pour une utilisation à 6 mois d'intervalle de la dose précédente.
Ont.	<p>Tous les individus âgés de 6 mois et plus sont admissibles pour recevoir un vaccin contre la COVID-19.</p> <p><u>Vaccins disponibles :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moderna De 6 mois à 5 ans, à 8 semaines d'intervalle. 2. Pfizer : pour les enfants de 5 ans et plus, à 8 semaines d'intervalle. 3. Novavax : pour les personnes allergiques aux vaccins à ARNm 4. Janssen : administré en dose unique 	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pfizer est approuvé pour la première dose de rappel 6 mois après la deuxième dose. <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Les vaccins à ARNm sont disponibles pour une dose de rappel à 6 mois d'intervalle après la série primaire. <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Les vaccins de Moderna ou de Pfizer peuvent être envisagés. • De 3 à 5 mois après avoir terminé leur série initiale. • Novavax est également disponible. 	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> Admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> • De 3 à 5 mois après leur première dose de rappel. <p><u>Vaccin bivalent :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le vaccin de Moderna est disponible pour les personnes de 18 ans et plus. • Le vaccin bivalent de Pfizer est approuvé à l'intervalle recommandé de 6 mois après la dernière dose pour les personnes de 12 ans et plus.

Province	Doses primaires	Première dose de rappel/troisième dose	Dose de rappel supplémentaire (incluant bivalent)
			<ul style="list-style-type: none"> Pour les personnes immunodéprimées, le vaccin bivalent est recommandé à un intervalle de 3 mois.
Qc	<p>Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus sont admissibles pour recevoir un vaccin primaire contre la COVID-19.</p> <p><u>Vaccins disponibles :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pfizer : approuvé pour les personnes âgées de 5 ans et plus à un intervalle de 8 semaines. Moderna : approuvé pour les personnes âgées de 6 mois et plus à un intervalle de 8 semaines. Novavax : pour les personnes âgées de 18 ans et plus Medicago <ul style="list-style-type: none"> Les vaccins à base de vecteurs viraux contre la COVID-19, y compris les vaccins d'AstraZeneca, de Covishield et de Janssen, ne sont pas actuellement disponibles au Québec. 	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Admissible.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin ARNm est privilégié 5 mois après la dernière dose. <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin Pfizer est recommandé 5 mois après la fin de la série initiale. <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Les vaccins à ARNm sont privilégiés 5 mois après avoir terminé leur série initiale. 	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Non admissible.</p> <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> Admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u> Admissible</p> <p><u>Vaccin bivalent :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin bivalent de Pfizer pour les personnes âgées de 12 ans et plus. Peut être administré à 5 mois d'intervalle depuis la dernière dose et à 3 mois si la personne a contracté la COVID-19 auparavant. Vaccin <u>bivalent de Moderna</u> pour les personnes de 30 ans et plus
N.-B.	<p>Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus sont admissibles pour recevoir un vaccin primaire contre la COVID-19.</p> <p><u>Vaccins disponibles :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pfizer : pour les personnes de 5 ans et plus, à 8 semaines d'intervalle. 	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Admissible</p>	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u></p>

Province	Doses primaires	Première dose de rappel/troisième dose	Dose de rappel supplémentaire (incluant bivalent)
	<p>2. Spikevax de Moderna : pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans, à 8 semaines d'intervalle. Est également privilégié pour les personnes de 30 ans et plus.</p> <p>3. Janssen : pour les personnes de 18 ans et plus, administré en une seule dose.</p> <p>4. Novavax : pour les personnes de 18 ans et plus, à 21 jours d'intervalle.</p> <p>5. Covifenz de Medicago : pour les personnes de 18 à 64 ans, à 21 jours d'intervalle.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Les vaccins monovalents à ARNm sont proposés à ce groupe à un intervalle de 5 mois depuis la dernière dose de la série primaire. <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Des vaccins monovalents à ARNm sont proposés. 5 mois après avoir terminé leur série initiale <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Des vaccins monovalents à ARNm sont proposés. 5 mois après avoir terminé leur série initiale 	<p>Admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaccin monovalent 5 mois après leur première dose de rappel. <p><u>Vaccin bivalent :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin bivalent de Pfizer pour les personnes âgées de 12 ans et plus. Vaccin bivalent de Moderna pour les personnes de 18 ans et plus. Recommandé si 5 mois se sont écoulés depuis la dernière dose.
N.-É.	<p>Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus sont admissibles pour recevoir un vaccin primaire contre la COVID-19.</p> <p><u>Vaccins disponibles :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Moderna : pour les enfants de 6 mois à 4 ans, à 8 semaines d'intervalle. Pfizer : approuvé pour les enfants de 5 à 11 ans, à 8 semaines d'intervalle. Janssen : pour les personnes de 18 ans et plus, administré en une seule dose. Novavax : pour les personnes de 18 ans et plus, à 21 jours d'intervalle. AstraZeneca 	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Les vaccins à ARNm sont préférables aux vaccins de Novavax et de Janssen. 168 jours après la deuxième dose <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Les vaccins à ARNm sont privilégiés. 168 jours après la deuxième dose <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> 168 jours après la deuxième dose 70 ans ou plus, 120 jours après la deuxième dose 	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> Admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u> Admissible</p> <p><u>Vaccin bivalent :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin bivalent de Pfizer pour les personnes âgées de 12 ans et plus. Vaccin bivalent de Moderna pour les personnes de 18 ans et plus

Province	Doses primaires	Première dose de rappel/troisième dose	Dose de rappel supplémentaire (incluant bivalent)
		<ul style="list-style-type: none"> Le vaccin bivalent de Moderna sera inclus dans la campagne de doses de rappel de l'automne. 	
Î.-P.-É.	<p>Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus sont admissibles pour recevoir un vaccin primaire contre la COVID-19.</p> <p>Vaccins disponibles :</p> <ol style="list-style-type: none"> Moderna : pour les enfants de 6 mois à 5 ans (dose pédiatrique) et de 6 à 11 ans, à 8 semaines d'intervalle. Pfizer : approuvé pour les enfants de 5 à 11 ans et les adultes plus âgés, à 8 semaines d'intervalle. Novavax : approuvé pour les personnes de 18 ans et plus, à 8 semaines d'intervalle. Janssen : pour les personnes de 18 ans et plus, administré en une seule dose. 	<p>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans Non admissible</p> <p>Enfants âgés de 5 à 11 ans Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Pfizer est approuvé 6 mois après la fin de la dose primaire. <p>Personnes âgées de 12 à 17 ans Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Moderna et Pfizer sont privilégiés. 5 mois après avoir terminé leur série initiale <p>Personnes âgées de 18 ans et plus+ Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Moderna et Pfizer sont privilégiés : 6 mois après avoir terminé leur série initiale Le vaccin de Janssen peut également être utilisé après avoir reçu la deuxième dose depuis au moins 2 mois. Le vaccin de Novavax est également disponible. 	<p>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans Non admissible</p> <p>Enfants âgés de 5 à 11 ans Non admissible</p> <p>Personnes âgées de 12 à 17 ans Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 mois après leur première dose de rappel. <p>Personnes âgées de 18 ans et plus Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 mois après leur première dose de rappel <p>Vaccin bivalent :</p> <ul style="list-style-type: none"> Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent désormais recevoir le vaccin bivalent Spikevax de Moderna pour leur dose de rappel. Aucune information n'est encore disponible sur le vaccin bivalent de Pfizer.
T.-N.-L.	<p>Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus sont admissibles pour recevoir un vaccin primaire contre la COVID-19.</p> <p>Vaccins disponibles :</p> <ol style="list-style-type: none"> Moderna : pour les enfants de 6 mois à 5 ans, à 8 semaines d'intervalle. 	<p>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans Non admissible</p> <p>Enfants âgés de 5 à 11 ans Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Pfizer est privilégié en raison d'un risque plus faible de myocardite. Recommandé à un intervalle de 8 semaines. 	<p>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans Non admissible</p> <p>Enfants âgés de 5 à 11 ans Non admissible</p> <p>Personnes âgées de 12 à 17 ans Non admissible</p>

Province	Doses primaires	Première dose de rappel/troisième dose	Dose de rappel supplémentaire (incluant bivalent)
	<p>2. Pfizer : pour les enfants âgés de 5 à 11 ans et les adultes plus âgés, à 8 semaines d'intervalle.</p> <p>3. AstraZeneca</p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin Covifenz de Medicago n'est pas encore disponible à Terre-Neuve-et-Labrador. 	<p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u></p> <p>Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin de Pfizer est préférable au vaccin de Moderna pour les personnes entre 12 et 29 ans. Novavax peut également être administré comme dose de rappel. 22 semaines après avoir terminé leur série initiale <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u></p> <p>Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> Les vaccins à ARNm sont privilégiés 22 semaines après avoir terminé la série initiale. 	<p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u></p> <p>Admissible</p> <p><u>Vaccin bivalent :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin bivalent de Pfizer pour les personnes de 12 ans et plus Le vaccin bivalent de Moderna pour les personnes de 12 ans et plus, si elles reçoivent le diagnostic suivant : <ul style="list-style-type: none"> syndrome de Down grossesse problème de santé chronique, notamment : <ul style="list-style-type: none"> asthme (modéré à grave) démence diabète maladie cardiaque hypertension artérielle maladie rénale maladie du foie maladie pulmonaire accident vasculaire cérébral êtes immunodéprimé, notamment si : <ul style="list-style-type: none"> vous souffrez d'une maladie sous-jacente, comme un cancer vous prenez des médicaments qui réduisent la réponse immunitaire, comme la chimiothérapie vous avez subi une greffe d'organe solide ou de cellules souches du sang

Province	Doses primaires	Première dose de rappel/troisième dose	Dose de rappel supplémentaire (incluant bivalent)
			<ul style="list-style-type: none"> ○ vous êtes obèse (si vous avez un indice de masse corporelle [IMC] de 40 ou plus) ● Personnes âgées de 18 ans et plus
Nt	<p>Tous les résidents du Nunavut âgés de 6 mois et plus sont admissibles pour recevoir un vaccin contre la COVID-19.</p> <p><u>Vaccins disponibles :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moderna : pour les personnes âgées de 6 mois et plus, à 4 semaines d'intervalle. 2. Pfizer : pour les personnes de 5 ans et plus, à 21 jours d'intervalle. 	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Les vaccins à ARNm (Moderna et Pfizer) sont admissibles 6 mois après avoir terminé leur série initiale. <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Moderna et Pfizer recommandent 6 mois après avoir terminé la série initiale. <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Moderna et Pfizer sont administrés 4,5 mois après avoir terminé leur série initiale. 	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 18 ans et plus</u> Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 4,5 mois après leur première dose de rappel <p><u>Vaccin bivalent :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Vaccin bivalent de Moderna pour les personnes de 18 ans et plus. ● Recommandé après que 3 à 6 mois se soient écoulés depuis la série primaire.
T.N.-O.	<p>Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus sont admissibles pour recevoir un vaccin primaire contre la COVID-19.</p> <p><u>Vaccins disponibles :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moderna : pour les enfants de 6 mois à 5 ans, de 4 à 16 semaines d'intervalle. 	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> Admissible</p>	<p><u>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Enfants âgés de 5 à 11 ans</u> Non admissible</p> <p><u>Personnes âgées de 12 à 17 ans</u> *Admissible</p>

Province	Doses primaires	Première dose de rappel/troisième dose	Dose de rappel supplémentaire (incluant bivalent)
	<p>2. Pfizer : pour les personnes de 5 ans et plus, de 3 à 16 semaines d'intervalle.</p> <p>3. Novavax : approuvé pour les personnes de 18 ans et plus, administré à 8 semaines d'intervalle.</p> <p>4. Paxlovid : (nirmatrelvir/ritonavir)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recommandé pour les patients présentant une infection symptomatique légère à la COVID-19 et entrant dans une catégorie de risque élevée désignée. - Les patients asymptomatiques ne sont pas admissibles à la prophylaxie, quel que soit le risque. - Réservé aux patients immunodéprimés, vaccinés mais n'ayant pas reçu de dose de rappel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Moderna et Pfizer sont privilégiés 6 mois après la deuxième dose. <p>Personnes âgées de 18 ans et plus Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moderna et Pfizer administrés 6 mois après la deuxième dose. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>personnes immunodéprimées</i> • 3 mois après leur première dose de rappel <p>Personnes âgées de 18 ans et plus Admissible</p> <p>Admissibilité au vaccin bivalent : Vaccin bivalent de Moderna pour les personnes de 18 ans et plus Le vaccin bivalent de Pfizer sera disponible en novembre 2022.</p>
Yn	<p>Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus sont admissibles pour recevoir un vaccin primaire contre la COVID-19.</p> <p>Vaccins disponibles :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Moderna : pour les enfants de 6 mois à 5 ans, à 8 semaines d'intervalle. 2. Pfizer : pour les enfants de 5 à 11 ans et plus, à 8 semaines d'intervalle. 3. Novavax : pour les personnes de 18 ans et plus, à 8 semaines d'intervalle. 	<p>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans Non admissible</p> <p>Enfants âgés de 5 à 11 ans</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moderna et Pfizer sont privilégiés 6 mois après la dose précédente. <p>Personnes âgées de 12 à 17 ans Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le vaccin Pfizer est privilégié 6 mois après la fin de la série initiale. <p>Personnes âgées de 18 ans et plus Admissible</p>	<p>Enfants âgés de 6 mois à 5 ans Non admissible</p> <p>Enfants âgés de 5 à 11 ans Non admissible</p> <p>Personnes âgées de 12 à 17 ans Non admissible</p> <p>Personnes âgées de 18 ans et plus *Admissible</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Personnes âgées de 50 ans et plus</i> • 6 mois après leur première dose de rappel

Province	Doses primaires	Première dose de rappel/troisième dose	Dose de rappel supplémentaire (incluant bivalent)
		<ul style="list-style-type: none"> L'utilisation des vaccins à ARNm est recommandée. Le vaccin de Novavax est également disponible pour une dose de rappel. 	<p><u>Vaccin bivalent :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Le vaccin bivalent de Moderna est disponible comme dose de rappel pour les adultes âgés de 18 ans et plus qui ont terminé une série primaire. Il est également indiqué pour les personnes âgées de 12 à 17 ans qui présentent certaines affections modérées à graves liées à l'immunodépression. La dose de rappel de vaccin bivalent est recommandée pour toutes les personnes 6 mois après avoir reçu un vaccin contre la COVID-19 ou 3 mois après avoir été infectées par la COVID-19.